


Skin tears – guide til forebyggelse og behandling

Hud/sår	Risiko for skin tears Aldrende, tør og pergamentagtig hud hos ældre samt kronisk syge og ved for tidligt fødte børn.	Type 1 - Ingen hudtab Lineær hudlæsion eller skred af hudlag. Hudlappen kan genplaceres, så den dækker hele såret.	Type 2 - Delvis hudtab Lineær hudlæsion eller skred af hudlag. Hudlappen kan genplaceres, men dækker ikke hele såret.	Type 3 - Fuldstændig hudtab Hele hudlappen er gået tabt, og såret er blottet.
				
Anbefalet forebyggelse/ behandling	Undgå at vaske huden med sæbe. Anvend badeolie el. vaskecreme. Smør med fugtighedscreme x 2 dgl. Min. 30% fedt, allergivenlig, ÷parfume. Korte negle, ingen smykker. Beskyt huden mod slag ift seng, stol, rollator, kørestol etc.	Stop blødning. Rens evt. sår og hudomgivelser. Vurdér hudlappens tykkelse og vitalitet. Genplacér hudlappen ud over hele sårbunden.	Stop blødning. Rens evt. sår og hudomgivelser. Vurdér hudlappens tykkelse og vitalitet. Genplacér hudlappen over så stort et sårareal som muligt. Vurdér infektionsrisiko.	Stop blødning. Rens evt. sår og hudomgivelser. Vurdér infektionsrisiko.
Anbefalet bandagevalg	Beskyt med Spycra Protect	Fiksér hudlappen med Spycra Protect	Fiksér hudlappen med Spycra Protect	Bandagér såret med PolyMem Silicone Border
				
	Kan sidde i op til 7 dage. Kan bæres i brusebad, duppes tørt, eller fjernes ved bad og genplaceres.	Lad Spycra Protect sidde mindst 5 dage. Tegn en pil, der indikerer i hvilken retning bandagen skal fjernes. Ved sivning af blod/sårsekret kan Spycra Protect dækkes med absorberende bandage, som fjernes efter 1-2 dage. Fiksér sekundær bandage med fikseringsbind.		Brug indikator: tegn lappens form, markér i hvilken retning bandagen skal fjernes. Skift bandagen efter 5-7 dage, eller efter behov.
Alternativt bandagevalg			PolyMem Silicone Border	PolyMem MAX

Ved infektionsrisiko anbefales: PolyMem Silicone Border Silver, eller PolyMem MAX Silver.

For detaljeret produktbeskrivelse: se bagsiden.

Produktinformation

Virkemåde

Indikation

Spycra Protect



Bi-elastisk silkeglat lycra-overside:

- bandagen kan strækkes i længde og bredde.
- former sig efter konturer, følger bevægelser.
- minimerer risiko for friktionsskader.

Blød silikoneklæber sikrer:

- at bandagen er skånsom mod huden.
- genplacering uden at miste klæbeevne.
- atraumatisk og smertefri fjernelse.

Åndbar:

- ingen risiko for maceration.
- høj bærekraft.

Spycra Roll



Tynd, transparent, åndbar polyuretan film med silikoneklæb:

- usteril og på rulle.
- god tilhæftning og skånsom fiksering.
- høj bærekraft.
- atraumatisk og smertefri fjernelse.

Yderst fleksibel, former sig efter konturer, følger bevægelser.
Åndbar, væske- og bakterietæt film beskytter mod forurening.

Forebyggelse af:

- skin tears ved udsat, skrøbelig eller aldrende hud.
- tryk-/hudskader pga friktion og shear.
- hudskader ved brug af medicinsk udstyr.

Beskyttelse og behandling af:

- skin tears type 1 og 2.
- overfladiske ikke- eller ringe væskende sår.
- trykudsatte hudområder, knoglefremspring, under proteser/ortoser.
- nylig helet sår/cikatrice og arbehandling.
- kløende/irriteret hud.
- intertrigo, eksem, EB og andre hudlidelser.

Til intakt hud, da filmen er usteril:

- beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, fx. mod friktion.
- fiksering af primær sårbandage.
- landingzone under kraftigt klæbende produkter.
- fiksering af slanger, dræn og katetre.

Skånsom beskyttelse og fiksering samt smertefri atraumatisk fjernelse.

PolyMem

Unikt terapeutisk sårbehandlingssystem, som:

- renser kontinuerligt, understøtter og accelererer autolytisk debridering.
- løsner, absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier.
- modulerer inflammation, beskytter vævet og reducerer mikrødæm i det område, som bandagen dækker.
- booster sårhelingsprocessen, reducerer infektion/infektionsrisiko samt evt. lugtgener.
- lindrer sårsmerte vha. anti-nociceptorisk effekt.

PolyMem Silicone Border



PolyMem Standard med åndbar filmbagside og blød silikoneklæbekant, der sikrer skånsom tilhæftning og atraumatisk fjernelse af bandagen.

Filmens er semipermeabel, beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt.

Behandling af:

- let til moderat væskende sår.
- tørre sår og tørre nekroser: fugt da sår el. bandage let med vand/NaCl før applicering.

Velegnet til skrøbelig hud, der ikke tåler vanlig klæber.

PolyMem MAX



PolyMem MAX med åndbar filmbagside.
Uden klæbekant, kan tilklippes efter behov.

Filmbagsiden beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt ved kantfiksering med film.

Behandling af:


- moderat til kraftig væskende sår.

Fikseres:

- med klæb og kun på kanterne.
- med cirkulær åndbar forbindelse.

Særdeles velegnet under kompression.

PolyMem Silicone Border Silver



PolyMem Standard tilsat sølv med antimikrobiel effekt. Sølv virker kun i bandagen og frigives ikke til sårbunden.
Den bløde silikoneklæbekant sikrer skånsom tilhæftning og atraumatisk fjernelse af bandagen.

Filmbagsiden beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt.


Behandling af:

- let til moderat væskende sår med kritisk kolonisering, risiko for infektion samt inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet.

Særdeles velegnet til:

- reduktion af lugtgener fra såret.
- skrøbelig hud, der ikke tåler vanlig klæber.

PolyMem MAX Silver



PolyMem MAX tilsat sølv med antimikrobiel effekt. Sølv virker kun i bandagen og frigives ikke til sårbunden.

Uden klæbekant, kan tilklippes efter behov.

Filmbagsiden beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt ved kantfiksering med film.

Behandling af:

- moderat til kraftig væskende sår med kritisk kolonisering, risiko for infektion samt inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet.

Særdeles velegnet til:

- reduktion af lugtgener fra såret.

Fikseres:

- med klæb og kun på kanterne.
- med cirkulær åndbar forbindelse.

Særdeles velegnet under kompression.

For yderligere information:

www.apodan.dk | info@apodan.dk | Tlf.: 32 97 15 25